

Rx

NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC

HANSOKGIN TAM THẤT

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC: Cho 1 viên nang cứng

- Cao đặc Tam thất 120mg tương đương với:

Tam thất (Radix Panasis notoginseng)

750mg

- Tá dược (Tinh bột sắn, Calci carbonat, Magnesi stearat, Talc) v.đ

1 viên

DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng

CÔNG NĂNG: Tán ứ chỉ huyết, tiêu sưng giảm đau

CHỈ ĐỊNH:

- Các trường hợp thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, ít ngủ, suy nhược cơ thể, phụ nữ sau khi sinh.

- Các chứng xuất huyết do rong kinh, chấn thương, chảy máu cam, ho ra máu, tiểu tiện ra máu.

CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Ngày uống 2 lần

+ Trẻ em: Theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc

+ Người lớn: - Mỗi lần 1-2 viên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc

- Phụ nữ có thai

- Chảy máu do nhiệt, xuất huyết não

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ: Không sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai. Thuốc dùng được cho phụ nữ nuôi con bú.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG Kỵ CỦA THUỐC:

- Tương tác: Chưa thấy có tài liệu ghi nhận.

- Tương kỵ: Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho Bác sỹ hoặc Dược sỹ những phản ứng có hại khi sử dụng thuốc

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

- Cách xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ và Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIÊU CHUẨN: TCCS