

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc
được sĩ. Để xa tầm tay trẻ em.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

Thuốc điều trị bệnh đục thủy tinh thể

POSOD Eye Drops

SDK: VN-18428-14

◆ THÀNH PHẦN

Mỗi lọ 10ml chứa:

Hoạt chất

Kali iodid 30mg

(tương đương 22,9mg iodid)

Natri iodid..... 30mg

(tương đương 25,4mg iodid)

Tá dược:

Methyl paraben, Propyl paraben, Hypromellose 2910, Boric acid, Borax, Natri clorid, Nước pha tiêm.

◆ DẠNG BẢO CHẾ

Dung dịch nhỏ mắt.

◆ ĐƯỢC LỰC HỌC

Iodid dùng toàn thân hay tại chỗ đều làm tăng chuyển hóa trong pha lê thể và có thể làm trong pha lê thể bị vẩn đục.

Hiệu quả của iodid đối với đục thủy tinh thể lão suy giai đoạn sớm chưa được xác định. Tuy nhiên, iodid có khả năng làm chậm tiến triển đục thủy tinh thể và ổn định thị lực.

◆ ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Tại chỗ:

Kali iodid khuếch tán nhanh vào pha lê thể (thử nghiệm trên mắt thỏ). Trong vòng 60 phút sau khi nhỏ, nồng độ Kali iodid trong thủy dịch là 0,25μmol/ml. 6,4% lượng iodid được tìm thấy trong thủy tinh thể, và 3,7% trong pha lê thể.

Toàn thân:

Hấp thu toàn thân sau khi nhỏ mắt chưa được nghiên cứu.

◆ CHỈ ĐỊNH

Thuốc nhỏ mắt POSOD được chỉ định dùng cho các bệnh nhân bị đục hoặc xuất huyết pha lê thể do tuổi tác, cận thị, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm quanh tĩnh mạch.

Đục thủy tinh thể mới khởi phát và tiến triển.

◆ LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Nhỏ 1 giọt vào mắt bị tổn thương, 1-3 lần mỗi ngày.

◆ CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng POSOD cho những bệnh nhân sau:

- Bệnh nhân quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân bị rối loạn chức năng tuyến giáp trạng.
- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.

◆ CẢNH BÁO

- Chỉ dùng thuốc để nhỏ vào mắt.
- Tránh để đầu ống nhỏ giọt tiếp xúc trực tiếp với mắt.
- Giữ thuốc tránh xa tầm tay trẻ.
- Tránh dùng thuốc quá một tháng sau khi đã mở hộp.
- Không thay đổi bao bì đóng gói để tránh dùng nhầm.
- Ăn nhẹ nhàng vào túi lệ sau khi nhỏ thuốc để giảm thiểu tác động toàn thân của thuốc.

◆ THẬN TRỌNG

- Tránh làm nhiễm bẩn thuốc, tránh để đầu ống nhỏ giọt chạm vào bất cứ bề mặt nào.
- Tháo kính sát trùng khỏi mắt trước khi dùng thuốc.

◆ TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa có tương tác thuốc nào được báo cáo.

◆ PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Chống chỉ định dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

◆ TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc ngay sau khi dùng thuốc vì có thể gây cảm giác bóng râm và chảy nước mắt.

◆ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Tại chỗ: ngứa, cảm giác bóng râm và chảy nước mắt có thể xảy ra.
- Toàn thân: vì POSOD có chứa iodid do đó có thể gây ra cường giáp và phát ban dạng viêm nang bả.

*** Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.**

◆ QUẢ LIỀU

Chưa có báo cáo đặc biệt nào về tình trạng sử dụng thuốc quá liều.

◆ BẢO QUẢN

Trong hộp kín, nơi khô mát dưới 30°C. Tránh để thuốc tiếp xúc ánh sáng hoặc để nơi quá nóng.

◆ ĐÓNG GÓI

10ml/lọ/hộp.

◆ HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Hạn dùng sau khi mở nắp: 1 tháng.

*** Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.**

Sản xuất bởi:



HANLIM PHARM.CO.,LTD.

2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

011114
161028
P32228-11

Read the instructions carefully before use.
For any more information, please consult your
doctor or pharmacist. Keep out of reach of children.
The drug is used upon doctor's prescription only.

Anticataractics

POSOD Eye Drops

Visa No.: VN-18428-14

◆ COMPOSITION

Each 10mL bottle contains:

Active ingredients:

Potassium iodide.....30mg

(22.9mg as iodide)

Sodium iodide.....30mg

(25.4mg as iodide)

Inactive ingredients:

Methyl paraben, Propyl paraben, Hypromellose
2910, Boric acid, Borax, Sodium chloride, Water
for injection.

◆ PHARMACEUTICAL FORM

Ophthalmic solution.

◆ PHARMACODYNAMICS

Not only by systemic but also by topical
application can iodides activate the metabolism
and occasionally counteract cloudiness of the
vitreous body.

The effect of iodine on early cataracta senilis has
not yet been established. Occasionally, it is
possible to slow down the progression of
cloudiness and the degradation of visual acuity.

◆ PHARMACOKINETICS

Local administration into the eye:

Potassium iodide diffuses rapidly into the vitreous
humor of the isolated rabbit's eye. Within 60
minutes, 0.25μmol of potassium iodide
accumulates in 1 mL of aqueous humor. 6.4% of
the iodide present in the treated eye was found in
the lens and 3.7% in the vitreous body.

Systemic administration:

The degree of systemic resorption after local
administration into the eye has not been
investigated.

◆ INDICATIONS

POSOD Eye Drops is indicated for use in patient
with opacity and hemorrhage of vitreous body
caused by aging, myopia, hypertension, diabetes,
periphlebitis and lens opacity as early symptom of
senile cataract.

◆ DOSAGE & ADMINISTRATION

Instill 1 drop in the affected eye(s), 1-3 times daily.

◆ CONTRAINDICATIONS

POSOD should not be used in those persons
followed:

- Those who are showing hypersensitivity to any
of the components.
- Patients with thyroid dysfunction.
- Pregnant women, nursing mothers and children.

◆ WARNINGS

- Ophthalmic use only.
- Avoid allowing the tip of the dispensing container
to contact the eye directly.
- Keep this and all drugs out of the reach of
children.
- Do not use the product for more than a month
after opening.
- Do not exchange the container to prevent misuse.
- Press the lacrimal sac lightly to minimise the
systemic effect after instillation.

◆ PRECAUTIONS

- To avoid contamination, do not touch tip of
container to any surface.
- Remove contact lenses before using.

◆ INTERACTIONS

No interaction.

◆ PREGNANCY AND LACTATION

This drug is contraindicated during pregnancy and
lactation.

◆ EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND OPERATE MACHINES

Right after instillation, cautions should be
exercised when driving and operating machines
because drug may cause burning and lacrimation.

◆ UNDESIRABLE EFFECTS

Topical: Stinging, burning and lacrimation may
occur.

- Systemic: As POSOD contains iodide, it may
cause hyperthyroidism and dactiform eruptions.

**Inform your doctor in case of any undesirable
effects related to drug use.*

◆ OVERDOSAGE

No report.

◆ STORAGE

Store in cool dry place below 30°C. Keep tightly
closed. Avoid exposure to light and excessive heat.

◆ PACKAGE

10mL/bottle/box.

◆ USE TERM

24 months from manufacturing date.

Shelf-life after opening: 1 month.

**Do not use if the drug is out of date*

Manufactured by:



HANLIM PHARM.CO.,LTD.

2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea