



SODIUM CHLORIDE 0,9%

Dung dịch tiêm truyền

CÔNG THỨC: cho 1 chai

Thành phần	Hàm lượng				
	Chai 100ml	Chai 200ml	Chai 250ml	Chai 500ml	Chai 1000ml
Natri clorid	0,9g	1,8g	2,25g	4,5g	9g
Nước cất pha tiêm vừa đủ	100ml	200ml	250ml	500ml	1000ml

DƯỢC LỰC HỌC:

- Khi tiêm truyền tĩnh mạch, dung dịch tiêm truyền SODIUM CHLORIDE 0,9% là nguồn cung cấp bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể.
- Natri là cation chính của dịch ngoại bào và có chức năng chủ yếu trong sự điều hòa phân bố nước, cân bằng dịch - điện giải và áp suất thẩm thấu của dịch cơ thể. Natri kết hợp với clorid và bicarbonat trong điều hòa cân bằng kiềm - toan. Clorid là anion chính của dịch ngoại bào, gắn kết chặt chẽ về chức năng sinh lý với ion natri, sự thay đổi cân bằng kiềm - toan được thể hiện bằng sự thay đổi nồng độ clorid trong huyết thanh.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Natri clorid được hấp thu rất nhanh qua đường tiêm truyền tĩnh mạch. Thuốc được phân bố rộng rãi trong cơ thể. Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu, một phần qua mồ hôi, nước mắt và nước bọt.

CHỈ ĐỊNH:

- Dùng trong các trường hợp sau:
 - Bổ sung natri clorid và nước trong các trường hợp mất nước: tiêu chảy, sốt cao, sau phẫu thuật, mất máu.
 - Phòng và điều trị thiếu hụt natri và clorid.
 - Thay thế dịch ngoại bào.
 - Xử lý tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa có mất dịch và giảm natri nhẹ.
 - Thẩm phân máu, dùng khi bắt đầu và kết thúc truyền máu.
 - Làm dung môi pha tiêm truyền một số thuốc tương hợp.

CÁCH DÙNG:

- Tiêm truyền tĩnh mạch.
- Liều dùng: tùy thuộc vào tuổi, cân nặng, tình trạng cơ thể, cân bằng kiềm - toan, nước và điện giải của người bệnh.
- Sử dụng thuốc theo chỉ định và hướng dẫn của bác sỹ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Người bệnh trong tình trạng dùng natri và clorid sẽ có hại: người bệnh bị tăng natri huyết, bị ứ dịch.
- Hội chứng phù trong bệnh xơ gan cổ trướng.

THẬN TRỌNG:

- Đặc biệt thận trọng ở bệnh nhân cao huyết áp, suy tim sung huyết, các tình trạng giữ natri hoặc phù khác, bệnh nhân cao tuổi, sau phẫu thuật, tăng kali huyết, người bệnh suy thận nặng, tiền sản giật, xơ gan, đang dùng các thuốc corticosteroid hoặc corticotropin.
- Không được dùng khi chai bị hở nút, chảy rỉ, có cặn.
- Trước khi sử dụng: cần kiểm tra kỹ các tiểu phân hoặc sự đổi màu của dung dịch bằng mắt thường và kiểm tra sự tương hợp của các thuốc pha thêm vào dung dịch.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Chưa thấy thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:

- Chỉ dùng cho phụ nữ có thai khi thật cần thiết.
- Thuốc không ảnh hưởng đến việc cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

- Hầu hết các phản ứng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm do dung dịch nhiễm khuẩn hoặc do kỹ thuật tiêm. Khi dùng các chế phẩm không tinh khiết có thể gây sốt, nhiễm khuẩn ở chỗ tiêm và thoát mạch. Tăng thể tích máu hoặc triệu chứng do quá thừa hoặc thiếu hụt một hoặc nhiều ion trong dung dịch cũng có thể xảy ra.

- Dùng quá nhiều natri clorid có thể làm tăng natri huyết và lượng clorid nhiều có thể gây mất bicarbonat kèm theo tác dụng toan hóa.

- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Thừa natri làm tăng bài tiết lithi, thiếu natri có thể thúc đẩy lithi bị giữ lại và tăng nguy cơ gây độc.

- Đề tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng.

QUA LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:

Khi xảy ra trường hợp thừa dịch hoặc thừa natri clorid, đánh giá lại tình trạng bệnh nhân và áp dụng các biện pháp điều trị thích hợp.

HẠN DÙNG:

- 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.
- Mỗi chai chỉ dùng 1 lần. Phần không dùng nữa phải hủy bỏ.

BẢO QUẢN:

Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

TRÌNH BÀY:

- Chai 100ml.
- Chai 200ml.
- Chai 250ml.
- Chai 500ml.
- Chai 1000ml.

Tiêu chuẩn áp dụng: DĐVN

Đề xa tầm tay trẻ em.

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.**

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR

297/5 Lý Thường Kiệt - Phường 15 - Quận 11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam